

《《婴幼儿常见病预防与护理宜忌速查》》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2015年04月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787512710078

编辑推荐

宝宝得了病怎么办？如何预防？一查就知！

帮助家长走出照料生病宝宝的误区，树立科学的养育观念。

重视疾病预防，养出健康宝宝。

内容简介

本书是系列丛书中的一本，是一本针对0-3岁婴幼儿常见病预防及护理宜忌问题的速查百科全书，内容覆盖新生儿、婴儿、幼儿常见病的护理和预防。本书内容详实，知识科学严谨。目录以疾病名称呈现，读者只需要了解该病的关键词，就可以很快找到其相关的护理和预防宜忌内容。本书注重从细节入手，针对性、实用性强，语言简洁，是帮助爸爸妈妈们科学养儿、爱儿的百科全书。

作者简介

ibaby母婴项目组致力于妊娠、分娩、育儿、早教的研究，由多名业内专家组成，为中国的妈妈和宝宝提供科学、前沿、全面、实用的养育知识。

目录

第一篇 新生儿期常见病防护宜与忌

新生儿产伤

头皮血肿

胸锁乳突肌血肿

骨折

臂丛神经麻痹

面神经麻痹
白眼球上的出血点
新生儿呼吸系统疾病
新生儿肺炎
新生儿湿肺
喉喘鸣
新生儿消化系统疾病
呕吐

新生儿产伤

胸锁乳突肌血肿

臂丛神经麻痹

白眼球上的出血点

新生儿肺炎

喉喘鸣

呕吐

食欲不佳

便秘

新生儿溶血病

新生儿红细胞增多症

新生儿中枢神经系统疾病

缺血缺氧性脑病

化脓性脑膜炎

新生儿佝偻病

晚期代谢性酸中毒

新生儿脐炎

新生儿发热

新生儿皮肤病

新生儿皮下坏疽

新生儿其他疾病

新生儿泪囊炎

先天性髋关节脱臼

第二篇 婴儿期常见病防护宜与忌

感冒

先天性喉喘鸣

湿疹

尿布疹

药物性皮炎

婴儿腹泻

婴儿肠绞痛

呕吐

循环系统疾病

心力衰竭

营养不良性贫血

白血病

过敏性疾病

过敏性皮炎

过敏性鼻炎

麻疹

水痘

手足口病

病毒性肝炎

细菌性痢疾

厌食症

流行性腮腺炎

支气管哮喘

口腔疾病

新生儿宜进行疾病筛查

新生儿用药宜注意哪些问题

早产儿使用抗菌药物宜注意哪些问题

宜学会早期发现宝宝有病

家庭宜常备哪些常用药和器械

宜学会进行人工呼吸

斜视宜尽早治疗

宜正确看待囟门的大小

补充多种维生素宜慎重

护理婴儿忌忽视的安全问题有哪些

忌滥用止咳糖浆

在线试读部分章节

第一篇 新生儿期常见病防护宜与忌 新生儿产伤

头皮血肿 1.什么是头皮血肿 一种情况是胎儿在出生过程中，胎头受子宫口过度挤压而发生水肿，形成一个包顶在头上。这个包称之为“先锋头”或“产瘤”，属正常现象。两三天内可逐渐变小吸收，不需任何处理。

另一种情况是胎头在产道中受到过度挤压后头颅明显变形，骨与骨膜间发生迁移，造成血管破裂，骨膜下出血，形成血肿。这个血肿可大可小，与受挤压的程度及损伤血管的粗细有关。一般在出生后两三天，当头皮水肿吸收后血肿可逐渐增大，三四天后停止增大，触之有波动感。

2.防治宜与忌 宜 头皮血肿除个别新生儿可加重黄疸及贫血外，一般无特殊症状，局部也无疼痛。血肿吸收较慢，需一两个月才能逐渐吸收机化（从边缘变硬，然后逐渐全部变硬）。在开始吸收机化时，血肿边缘高起，中间凹下，像个碟子，这不是头颅缺损，而是血肿机化的表现，不需求医，不必做任何处理。

忌 为防止感染，千万不可用针对头皮血肿处进行抽血处理。

胸锁乳突肌血肿 1.什么是胸锁乳突肌血肿 有少数新生儿（特别是臀位产儿）在出生时未见异常，出生后10~20天家长会发现在婴儿的颈部一侧肌肉（胸锁乳突肌）的中下部有一个直径约2厘米~3厘米大小的包块儿，呈圆形或椭圆形，质地硬，可移动，外观不红，抚之不热，触之不痛。这可能是在分娩过程中颈部过度向一侧牵拉，造成胸锁乳突肌损伤而形成的血肿；但也有因胎儿在宫内胎位不正，受到压力而颈部结构改变所致；还有人认为是胸锁乳突肌的先天缺陷，患儿大多有家族史。具体病因目前还不很明确，这种孩子的头向有肿块的一侧倾斜，而下颌及面部则转向无肿块的一侧，孩子成了歪脖子，也就是斜颈。本病为先天性可能性较大，故在新生儿期就应给予治疗。

2.防治宜与忌 宜 用纱布袋或枕头使小儿头颈保持正位。让光源来自有肿物的一侧，小儿头部常转向光亮处，对防止病侧肌肉萎缩有一定帮助。

在胸锁乳突肌包块处做按摩推拿治疗，从轻到重，圆周按摩，每天上下午各1次，每次按摩做250~300次。

固定小儿的两侧肩部，然后给头部做被动运动，下颌向病侧旋转，头向正常的一侧转，每天牵拉四五次，每次5~10分钟。

忌 此病忌延误病情。经上述处理，多数孩子可痊愈，若患儿半岁仍未痊愈，就要及早考虑外科手术治疗，以免引起头面部发育不对称，造成终生遗憾。

骨折 1.骨折的原因及表现 新生儿因产伤骨折并不少见，主要原因是产妇在分娩过程中用力不当，用力过猛或助产人员动作粗暴及技术不够熟练。也有在分娩过程中，胎儿迅速下降，前肩胛部挤向产妇骨盆耻骨联合处，使锁骨极度弯曲而发生的自然骨折。锁骨骨折的部位一般在生理弯曲较细的地方，多以一侧为主。

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)